

Atles Virtual de Plantes Medicinals UMH

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo.
Familia Asteraceae/Compositae

Sinonímia:

Santolina chamaecyparissussubsp. magonica O.Bolòs, Molin. & P.Monts.
Santolina chamaecyparissusvar. magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.)
O.Bolòs & Vigo

Noms comuns:

Castellà: Manzanilla, manzanilla de Mahón
Català: Camamilla, camamil·la, camamil·la
mallorquina, camamil·lera, camomil·la de Maó,
santolina.

Descripció botànica:

Mata aromàtica de fins a 50 cm, tomentosa-
canescent no viscosa, amb tiges erectes que es
ramifiquen en la seua zona mitjana. Fulles
decurrents, disposades per tota la tija
completament dividides en lòbuls linears,
densament peloses, de color verd-grisenc
quasi blanquinós.

Inflorescència:

Capítols solitaris, rarament 2 o 3 en panícula
laxa, amb peduncles lleugerament engrossits
cap a la base del capítol. Involucre pelós.
Només posseeix flòsculs grocs.

Fruit: Aqueni castanyer-grisenc d'1,8-2,1 mm, comprimit dorsiventralment, amb
4 – 5 costelles, les dues laterals alades.

Floració: Entre maig i agost. (Flora Ibérica, 2019)

Descripció microgràfica:

Capítols [6-10 mm] hemisfèrics.

Involucre [(6-9 mm) pelós, amb bràctees en 3-4 sèries, carenades, peloses i amb
glàndules sèssils en la base (almenys les externes).

Bràctees externes [2,7-3,1 x 0,8-1,3 mm] triangular-lanceolades, amb marge escariós
hialí en tota la seua longitud.

Bràctees mitjanes i internes [3,3-3,8 x 1,2-1,6 mm] d'oblong-triangulars a
lanceolades, amb marge escariós hialí en tota la seua longitud.

Pàlees de l'involucre [2-3,1-0,6-1 mm] peloses en la seua part superior.

Flòsculs de color groc [3-4 x 0,6-1 mm] amb 5 dents triangulars.

